

| Maladie   | 病名                       | Vaccin  | Quand injections  | Rappel   | Obligatoire /<br>recommandé                               |
|---|--------------------------|---|---|--|---|
| Vaccins obligatoires et/ou recommandés à l'ensemble des enfants |                          |   |   |  |   |
| Tuberculose   | 肺结核                      | BCG (bacille de Calmette et Guérin) (ex. MONOVAX) | Dès le premier mois, 1 injection  | Non  | recommandation générale                                   |
| Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Polio, Haemophilus Influenzae b | 白喉, 天花, 百日咳, 骨髓灰质炎, B型流感 | Vaccin DTP (ex. PENTACOQ ou INFANRIX Quinta)      | A partir de 2 mois en 3 injections à 1 mois d'intervalle  | 1 rappel 1 an après la dernière injection. Ensuite tous les 5 ans jusqu'à 18 ans, après 18 ans, tous les 10 ans pour Tétanos et Polio. | Obligatoire pour DTP et recommandé pour Coqueluche et HIB |
| Infections à Pneumocoque (pneumonie, méningite à pneumocoque)   | 肺炎双球菌性肺炎或脑膜炎             | Prevenar  | A partir de 2 mois en 3 injections à 1 mois d'intervalle  | 1 rappel entre 12 et 15 mois   | recommandation générale                                   |
| Hépatite B  | 乙肝                       | Engerix B10                                       | A partir de 2 mois, 2 injections à 1 mois d'intervalle et la 3ème injection 5 à 12 mois après la 2ème.  | Non  | recommandation générale                                   |
| Rougeole, Oreillons, Rubéole                                    | 麻疹, 流行性腮腺炎, 风疹           | ROR Vax ou Priorix                                | A partir d'1 an. 1 dose à 12 mois et la 2ème au moins un mois après si possible avant l'âge de 24 mois. | Non  | recommandation générale                                   |

|  |                 |           |  |                                |                         |
|--|-----------------|-----------|--|--------------------------------|-------------------------|
| Infections à HPV<br>(papillomavirus humains 6, 11, 16, 18) | 宫颈癌             | Gardasil  | A partir d'14 ans, 3 injections : 2 mois entre la 1ère et la 2ème et 4 mois entre la 2ème et la 3ème.    | Non                            | recommandation générale |
| Autres vaccins   |                 |           |  |                                |                         |
| Méningite à méningocoque                                   | 脑膜炎奈瑟菌引起的病毒性脑膜炎 | Meninvact | Pour les moins de 12 mois, 3 injections à 1 mois d'intervalle.<br>Pour les plus de 12 mois, 1 injection. | Non                            |                         |
| Gastro-entérites aiguës à Rotavirus                        | 轮状病毒引起的急性肠胃炎    | Rotarix   | A partir de 6 semaines, 2 doses orales à 4 semaines d'intervalle.  | Non                            |                         |
| Varicelle  | 水痘              | VarilRix  | De 12 mois à 12 ans, 1 seule injection. A partir de 13 ans, 2 doses à 4 à 8 semaines d'intervalle.       | Non                            |                         |
| Hépatite A   | 甲肝              | Havrix    | A partir d'1 an, 1 dose.   | 6 à 12 mois après l'injection. |                         |